

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES  
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) XXXXXX

ABONNEMENT ANNUEL 60 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.  
Sous Régisseur de recettes et d'avances  
AVERTISSEMENTS AGRICOLES  
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

58.39.02

BULLETIN N° 162 (6/80) 10 MARS 1980

-----

## / CAMPAGNOLS des CHAMPS /

## RESULTATS des PIEGEAGES et OBSERVATIONS

Les principaux résultats des piègeages réalisés en décembre-janvier puis fin février 1980 sont consignés dans le tableau ci-après :

SECTEURS	DATES PIEGEAGES	DENSITE CAMPAGNOLS/HECTARE				Indice reprod. femelle	%animaux moins de 60 jours
		Refuges	Prairies Nat.	Cultures Art. dérobées	Céréales		
THOUARS	17.12.79	179	52	-	5	47	62 %
THOUARS	21.01.80	296	92	0	0	76	16 %
VILLIERS-ECHIRE	03.12.79	18	5	0	0	4	100 %
USSEAU	10.12.79	4	33	25	-	14	20 %
BEAUVOIR	17.12.79	71	15	25	25	25	42 %
St SATURNIN	17.12.79	67	14	-	-	8	61 %
BRIOUX SUD	10.12.79	37	40	118	18	37	40 %
BRIOUX NORD	07.01.80	33	11	125	25	21	70 %
AULNAY	07.01.80	29	13	-	-	7	75 %
CHAUNAY (groies)	10.12.79	40	25	60	-	35	41
ROM "	14.01.80	41	27	0	13	22	72 %
ROM-St SAUVANT (terres rouges)	14.01.80	245	70	200	-	55	130
ROM-St SAUVANT	26.02.80		272				62 %
VOUHARTE	07.01.80	105	55	215	-	15	74
PLEUMARTIN	14.01.80	196	80	35	-	5	59
MARANS	14.01.80		12			12	33 %
ARVERT	21.01.80		30			30	50 %

Ces résultats sont donnés, pour chaque secteur de piègeage, en nombre moyen de campagnols par hectare dans les divers milieux :

- refuges (bermes, friches, chaumes, bords de chemin enherbés),
- prairies naturelles ou artificielles (graminées, trèfle, luzerne)
- terres labourées ou semis de céréales, cultures dérobées, en particulier semis de colza grains ou fourragers.

Le nombre moyen de campagnols par hectare pour l'ensemble de chaque secteur est calculé en fonction de l'importance des divers milieux. Le niveau de la reproduction et l'âge des animaux sont également indiqués.

P. 392

Ces résultats montrent :

- des densités moyennes par secteur généralement faibles (inférieures à 50 animaux/ha) sauf dans les zones où les terres sont restées fraîches en août-septembre permettant une bonne alimentation des animaux, en particulier dans les terres rouges à châtaigniers.
- des densités parfois fortes dans les refuges, les prairies artificielles et les cultures dérobées enherbées.
- Une forte proportion d'animaux jeunes en décembre-janvier, conséquence des conditions favorables des mois de septembre, octobre et de la première moitié de novembre, ceci dans presque tous les secteurs à l'exclusion des marais de Charente-Maritime.
- La poursuite de la reproduction à un taux assez élevé en décembre et janvier.
- une nette reprise de la reproduction fin février avec 60 % de femelles gestantes et une moyenne de trois embryons par femelle.

De ces divers éléments ressortent des indications permettant de prévoir les risques encourus sur céréales en juin.

#### 1/ ZONES A HAUT RISQUE DE PULLULATION SUR CEREALES

- Terres rouges à châtaigniers dans les régions de St Sauvant, Lusignan, Rouillé, Ceaux en Couhé, Brux, Romagne, Payré, Chatillon, Blanzay, dans la Vienne; région de Saint Léger, l'Enclave de la Martinière, pourtour du Bois de la Foye près de Lezay dans les Deux-Sèvres.
- Plaines de Thouars notamment sur les Communes de Saint Géréroux, Irais, Noizé, Brie, Marnes et Saint Jouin de Marnes dans les Deux-Sèvres.
- Région de Vouharte en Charente

Dans ces zones les traitements doivent être effectués :

- en pleine surface dans les parcelles fortement infestées (bermes, friches, prairies naturelles ou artificielles).
- en bordure des parcelles de céréales jouxtant les parcelles refuges et sur les zones de colonisation à l'intérieur des parcelles de céréales.

#### 2/ ZONES A RISQUE LIMITE DE PULLULATION

- Région de Brioux (79): en particulier dans les colzas grain et fourrager fortement enherbés;
- Région de Pleumartin (86) en particulier sur les Communes de Chenevelles, Leigné les Bois, Archigny et Monthoiron;
- Région de Gençay (86) Communes de Champagné St Hilaire, La Ferrière-Ayroux, Brion, Gençay, Saint Secondin, Anché;
- Région d'Usseau (79) risque faible d'attaque plus tardive sur la zone de La Rochenard, Petit Breuil, Olbreuse, Deyrançon.

Surveiller attentivement les refuges et les prairies temporaires et naturelles.  
Traiter, s'il y a lieu, les parties infestées ou en cours de colonisation.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Service de la Protection des Végétaux ou aux Fédérations de Groupements de Défense contre les Ennemis des Cultures.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire  
"Poitou-Charentes" :

R. GUILLEMET

Imprimé à la Station le 10 Mars 1980 - Précédente Note : Bulletin N° 161 du 21 Février 1980.

N° Papier de Presse : 535 AD.